

Standard di qualità

Area clinica	Indicatore	Peso (%)						Vincolo*	Soglia
			MOLTO ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	MOLTO BASSO		
			1	2	3	4	5		
CARDIOCIRCOLATORIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalita' a 30 giorni	30	% ≤ 6	6-8	8-12	12-14	> 14		
	Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 90 minuti	15	% ≥ 60	50-60	40-50	20-40	< 20		
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalita' a 30 giorni	10	% ≤ 6	6-9	9-14	14-18	> 18		
	By-pass Aortocoronarico: mortalita' a 30 giorni (NV)	20	% ≤ 1.5		1.5-4		> 4	Volume di interventi	180 (media biennio)
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalita' a 30 giorni	15	% ≤ 1.5		1.5-4		> 4		
	Riparazione di aneurisma non rotto dell' aorta addominale: mortalita' a 30 giorni	10	% ≤ 1		1-3		> 3		
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalita' a 30 giorni	75	% ≤ 8	8-10	10-14	14-16	> 16		
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalita' a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	25	% ≤ 1.5		1.5-3.5	3.5-5	> 5		
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalita' a 30 giorni	100	% ≤ 5	5-7	7-12	12-16	> 16		
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	100	% ≥ 80	70-80	60-70	50-60	< 50	Volume di ricoveri	90
CH. ONCOLOGICA	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	34	% ≤ 5	5-8	8-12	12-18	> 18	Volume di ricoveri	135
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalita' a 30 giorni	33	% ≤ 0.5		0.5-3		> 3	Volume di ricoveri	85
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalita' a 30 giorni	33	% ≤ 1	1-3	3-6	6-8	> 8	Volume di ricoveri	45
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (500 ≤ vol < 1000)	70	% ≤ 10	10-20	20-30	30-35	> 35	Volume di ricoveri	500
	Proporzione di parti con taglio cesareo primario (vol ≥ 1000)		% ≤ 20	20-25	25-30	30-35	> 35		
	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	15	% ≥ 40	25-40	13-25	5-13	≤ 5		
	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	15	% ≤ 5	5-10	10-15	15-20	> 20		
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48h	60	% ≥ 70	60-70	40-60	30-40	< 30	Volume di ricoveri	65
	Intervento di protesi di anca: riammissioni a 30 giorni	20	% ≤ 3		3-9		> 9	Volume di ricoveri	80
	Intervento di protesi di ginocchio: riammissioni a 30 giorni	20	% ≤ 3		3-9		> 9	Volume di ricoveri	80
NEFROLOGIA	Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero	100	% ≤ 8	8-10	10-20	20-30	> 30	Volume di ricoveri	65

*Volume di attività della struttura inferiore alla soglia (tolleranza del 10%) fissata dal Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (DM Salute 70/2015) o desumibile dalla letteratura scientifica.